



Product Profile

CircoGard®

Porcine Circovirus Vaccine, Type 2, Killed Baculovirus Vector

Product Description

- One-dose porcine circovirus (PCV) Type 2b vaccine for vaccination of swine
- Inactivated trivalent-adjuvanted formulation using StimGard Plus™ adjuvant
- Each vial contains 50 or 250 doses (1 mL/dose)



Advantages

- Labor-saving 1-mL dose – easy on nursing piglets and staff.
- Safe for use in young animals.
- Demonstrated heterologous circovirus protection.
- 3 different classes of adjuvants in StimGard Plus™ help provide for an optimal immune response.

Dosage / Administration

- Shake well before use. Using aseptic technique, inject a single 1.0-mL dose intramuscularly (IM).

Indications / Uses

- For use in healthy piglets of all breeds, 10 days of age or older, against Porcine Circovirus, Type 2.
- Visit USDA website for full label indications & technical information. (productdata.aphis.usda.gov).

Precautions

- CAUTION: For animal use only.
- Store at 2 to 8°C (35-45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening.
- Do not vaccinate within 21 days before slaughter.
- Transient reaction may occur at the injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative.
- This product has not been tested in pregnant animals.

Packaging

- 50-mL or 250-mL vials.
- Other sizes available.

Ordering Information

- Prod. number:
22010c-50 (50 mL)
22010c-250 (250 mL)

Key Features

- Pig-proven under field conditions.
- StimGard Plus™ trivalent adjuvant system helps optimize both cell-mediated and humoral immune responses.
- Safe.
- Excellent syringeability.
- Advanced purification process allows low-volume injection for minimal tissue reaction.
- QR (quick response) codes on the label for inventory and tracking purposes.

The labeling contains complete use information, including any cautions and warnings. Always read, understand and follow the labeling and use directions. See the reverse side for use directions and additional information.



Pharmgate
ANIMAL HEALTH

5204 Tenth Line, R.R. #2
Erin, ON NoB 1T0
800.465.2450
Pharmgate.com

CircoGard®

Porcine Circovirus Vaccine, Type 2, Killed Baculovirus Vector

Porcine Circovirus Vaccine, Type 2,
Killed Baculovirus Vector

Vaccin contre le circovirus porcin,
type 2, vecteur baculovirus tué

CircoGard® | 250 ML
250 DOSES



This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy piglets, 10 days of age or older against Porcine Circovirus, Type 2. To review efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

ADMINISTRATION AND DOSAGE: Dose: 1.0 mL intramuscularly (I.M.).

CAUTION: For animal use only. Do not mix with other products, except as specified on this label. In case of human exposure, contact a physician. Store at 2-8°C (35-45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Transient reaction may occur at injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative. This product has not been tested in pregnant animals. Revaccination interval not established.

[Open Here / Ouvrir Ici](#) →

Product No./ N° produit:

Serial No./ N° série:

Exp. Date/Date de pér.:

Manufactured by/Fabriqué par :

Pharmgate Biologics
2575 University Avenue
West, Suite 100,
St. Paul, MN 55114
1-800-465-2450
VLN 329

Pharmgate Animal Health swine vaccines/bacterins.

Product	Doses	Pharmgate Product Number
MycoGard® (2 dose)	50	20020c-50
MycoGard® (2 dose)	250	20020c-250
MycoGard-1™ (1 dose)	50	21010c-50
MycoGard-1™ (1 dose)	250	21010c-250
CircoGard® (1 dose)	50	22010c-50
CircoGard® (1 dose)	250	22010c-250
Circo/MycoGard® (1 dose)	50	25010c-50
Circo/MycoGard® (1 dose)	250	25010c-250



Profil du Produit

CircoGard®

Vaccin circovirus porcin de type 2, vecteur baculovirus tué

Description du Produit

- Vaccin circovirus porcin (CVP) de type 2b à une dose pour la vaccination des porcs
- Formule à adjuvant trivalent inactivé utilisant l'adjuvant StimGard Plus™
- Chaque flacon contient 50 ou 250 doses (dose de 1 ml)



Avantages

- Dose de 1 ml: facile d'utilisation pour la main-d'oeuvre – sans danger pour les porcelets et le personnel.
- Utilisation sans danger pour les jeunes animaux.
- Protection démontrée contre les souches de circovirus hétérologue.
- Trois catégories différentes d'adjuvants dans le StimGard Plus™ aident à produire une réaction immunitaire optimale.

Dosage / Administration

- Bien mélanger avant l'utilisation. De façon aseptique, injecter une seule dose de 1,0 ml par voie intramusculaire (IM).

Indications / Usage

- Pour vacciner des porcelets en santé de toutes les races, âgés de 10 jours ou plus, afin de lutter contre le circovirus porcin de type 2.
- Visiter le site Internet de l'USDA pour voir toutes les indications se trouvant sur l'étiquette ainsi que les renseignements techniques (productdata.aphis.usda.gov).

Toujours lire, comprendre et suivre les directives et le mode d'emploi se trouvant sur l'étiquette.

Précautions

- MISE EN GARDE : Destiné aux animaux seulement.
- Conserver à une température variant entre 2 et 8 °C (35 et 45 °F). Ne pas congeler. Bien mélanger avant l'utilisation. Utiliser le contenu complet après l'ouverture.
- Ne pas vacciner durant la période de 21 jours avant l'abattage.
- Une réaction isolée peut se produire au site de l'injection. En cas d'anaphylaxie, utiliser de l'épinéphrine ou l'équivalent. Contient du merthiolate (Thimérosal) comme agent de conservation.
- Ce produit n'a pas été testé sur les femelles en gestation.

Emballage

Flacons de 50 ou 250 ml.

Renseignements de commande

- Numéro du produit:
22010c-50 (50 mL)
22010c-250 (250 mL)

Caractéristiques Clés

- Testé sur les porcs dans des conditions réelles d'élevage.
- Système d'adjuvant trivalent StimGard Plus.™
- Sécuritaire.
- Facile à injecter.
- Le processus de purification avancé permet l'injection d'un faible volume afin de minimiser les réactions des tissus au site d'injection.
- Codes QR (réponse rapide) sur l'étiquette pour les besoins d'inventaire et de suivi.



Pharmgate
ANIMAL HEALTH

5204 Tenth Line, R.R. #2
Erin, ON NoB 1T0
800.465.2450
Pharmgate.com

CircoGard®

Vaccin circovirus porcin de type 2, vecteur baculovirus tué

Porcine Circovirus Vaccine, Type 2, Killed Baculovirus Vector
Vaccin contre le circovirus porcin,
type 2, vecteur baculovirus tué

CircoGard® | 250 ML
250 DOSES



This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy piglets, 10 days of age or older against Porcine Circovirus, Type 2. To review efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

ADMINISTRATION AND DOSAGE: Dose: 1.0 mL intramuscularly (I.M.).

CAUTION: For animal use only. Do not mix with other products, except as specified on this label. In case of human exposure, contact a physician. Store at 2-8°C (35-45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Transient reaction may occur at injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative. This product has not been tested in pregnant animals. Revaccination interval not established.

[Open Here / Ouvrir Ici](#) →

Product No./ N° produit:

Serial No./ N° série:

Exp. Date/Date de pér.:

Manufactured by/Fabriqué par :

Pharmgate Biologics
2575 University Avenue
West, Suite 100,
St. Paul, MN 55114
1-800-465-2450
VLN 329

HINGE

Ce produit a été démontré comme étant efficace pour la vaccination chez les porcelets sains, âgés de 10 jours ou plus contre le circovirus porcin, type 2. Pour consulter les données sur l'efficacité et l'innocuité, visitez le productdata.aphis.usda.gov.

Administration et dosage : Dose: 1,0 mL par voie intramusculaire (IM).

Précaution : Destiné aux animaux seulement. Ne pas mélanger avec d'autres produits, à moins d'être indiqué sur l'étiquette. En cas d'exposition humaine, consultez un médecin. Conserver entre 2 et 8 °C (35-45 °F). Ne pas congeler. Bien agiter avant l'utilisation. Utiliser tout le contenu de la fiole ouverte. Ne pas vacciner dans les 21 jours précédant l'abattage. Une réaction transitoire peut se manifester au site d'injection. En cas d'anaphylaxie, utiliser de l'épinéphrine ou autre produit équivalent. Contient du merthiolate (Thimérosal) comme agent de conservation. Ce produit n'a pas été testé chez les animaux en gestation. L'intervalle pour les rappels de vaccin n'est pas établi.

Pharmgate Animal Health swine vaccines/bacterins.

Product	Doses	Pharmgate Product Number
MycoGard® (2 dose)	50	20020c-50
MycoGard® (2 dose)	250	20020c-250
MycoGard-1™ (1 dose)	50	21010c-50
MycoGard-1™ (1 dose)	250	21010c-250
CircoGard® (1 dose)	50	22010c-50
CircoGard® (1 dose)	250	22010c-250
Circo/MycoGard® (1 dose)	50	25010c-50
Circo/MycoGard® (1 dose)	250	25010c-250

