



# Product Profile

## Circo/MycoGard<sup>®</sup>

### Porcine Circovirus Vaccine, Type 2, Killed Baculovirus Vector, *Mycoplasma hyopneumoniae* Bacterin

#### Product Description

- One-dose combination of porcine circovirus (PCV) Type 2b vaccine and *Mycoplasma hyopneumoniae* bacterin for vaccination of swine
- Inactivated trivalent-adjuvanted formulation using StimGard Plus<sup>™</sup> adjuvant
- Each vial contains 50 or 250 doses (1 mL/dose)



#### Advantages

- Ready to use (RTU) - no mixing required.
- Labor-saving 1-mL dose – easy on nursing piglets and staff.
- Control 2 diseases in 1 injection.
- Demonstrated heterologous circovirus protection.
- 3 different classes of adjuvants in StimGard Plus<sup>™</sup> help provide for an optimal immune response.

#### Dosage / Administration

- Shake well before use. Using aseptic technique, inject a single 1.0-mL dose intramuscularly (IM).

#### Indications / Uses

- For use in healthy piglets of all breeds, 10 days of age or older, against Porcine Circovirus, Type 2, and *Mycoplasma hyopneumoniae*.
- Visit USDA website for full label indications & technical information. ([productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov)).

#### Precautions

- CAUTION: For animal use only.
- Store at 2 to 8°C (35-45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening.
- Do not vaccinate within 21 days before slaughter.
- Transient reaction may occur at the injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative.
- This product has not been tested in pregnant animals.

#### Packaging

- 50-mL or 250-mL vials.
- Available in custom sizes.

#### Ordering Information

- Prod. number:  
25010c-50 (50 mL)  
25010c-250 (250 mL)

## Key Features

- Pig-proven under field conditions.
- StimGard Plus<sup>™</sup> trivalent adjuvant system helps optimize both cell-mediated and humoral immune responses.
- Safe; studies show a <0.3% reaction rate.
- Excellent syringeability.
- Advanced purification process allows low-volume injection for minimal tissue reaction.
- No mixing means less handling, mistakes and mess
- QR (quick response) codes on the label for inventory and tracking purposes.

The labeling contains complete use information, including any cautions and warnings. Always read, understand and follow the labeling and use directions. See the reverse side for use directions and additional information.



**Pharmgate**  
ANIMAL HEALTH

5204 Tenth Line, R.R. #2  
Erin, ON NoB 1T0  
800.465.2450  
[Pharmgate.com](http://Pharmgate.com)

# Circo/MycoGard<sup>®</sup>

Porcine Circovirus Vaccine, Type 2, Killed Baculovirus Vector, *Mycoplasma hyopneumoniae* Bacterin

Porcine Circovirus Vaccine,  
Type 2, Killed Baculovirus Vector,  
*Mycoplasma Hyopneumoniae* Bacterin  
Vaccin contre le circovirus porcin, type  
2, vecteur baculovirus tué, bactérine  
de *Mycoplasma hyopneumoniae*

Circo/MycoGard<sup>®</sup> | 250 ML  
250 DOSES



This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy piglets, 10 days of age or older against Porcine Circovirus, Type 2, and *Mycoplasma Hyopneumoniae*.

To review efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**ADMINISTRATION AND DOSAGE:**

Dose: 1.0 ml intramuscularly (I.M.).

**CAUTION:** For animal use only. Do not mix with other products, except as specified on this label. In case of human exposure, contact a physician. Store at 2 to 8°C (35°F to 45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Transient reaction may occur at the injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative. This product has not been tested in pregnant animals. Revaccination interval not established.

[Open Here / Ouvrir Ici](#) →

Product No./ N° produit:

Serial No./ N° série:

Exp. Date/Date de pér.:

Manufactured by/Fabriqué par :

**Pharmgate Biologics**  
2575 University Avenue  
West, Suite 100,  
St. Paul, MN 55114  
1-800-465-2450  
VLN 329

## Pharmgate Animal Health swine vaccines/bacterins.

Product	Doses	Pharmgate Product Number
MycoGard <sup>®</sup> (2 dose)	50	20020c-50
MycoGard <sup>®</sup> (2 dose)	250	20020c-250
MycoGard-1 <sup>™</sup> (1 dose)	50	21010c-50
MycoGard-1 <sup>™</sup> (1 dose)	250	21010c-250
CircoGard <sup>®</sup> (1 dose)	50	22010c-50
CircoGard <sup>®</sup> (1 dose)	250	22010c-250
Circo/MycoGard <sup>®</sup> (1 dose)	50	25010c-50
Circo/MycoGard <sup>®</sup> (1 dose)	250	25010c-250




# Profil du Produit

## Circo/MycoGard®

**Vaccin circovirus porcin de type 2, vecteur baculovirus tué, bactérienne *Mycoplasma hyopneumoniae***

### Description du Produit

- **Combinaison à une dose du vaccin circovirus porcin (CVP) de type 2b et de la bactérienne *Mycoplasma hyopneumoniae* pour la vaccination des porcs**
- **Formule à adjuvant trivalent inactivé utilisant l'adjuvant StimGard Plus™**
- **Chaque flacon contient 50 ou 250 doses (1 ml/dose)**



### Avantages

- Prêt à être utilisé – aucun mélange requis.
- Dose de 1 ml; réduit la main-d'œuvre – facile d'utilisation pour les porcelets et le personnel.
- Contrôle deux maladies grâce à une seule injection.
- Protection démontrée contre le circovirus hétérologue.
- Trois catégories différentes d'adjuvants dans le StimGard Plus™ aident à fournir une réaction immunitaire optimale.

### Dosage / Administration

- Bien mélanger avant l'utilisation. De façon aseptique, injecter une seule dose de 1,0 ml par voie intramusculaire (IM).

### Indications / Usage

- Pour vacciner des porcelets en santé de toutes les races, âgés de 10 jours ou plus, afin de lutter contre le circovirus porcin de type 2 et le M. hyopneumoniae.

- Visiter le site Internet de l'USDA pour voir toutes

les indications se trouvant sur l'étiquette ainsi que les renseignements techniques ([productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov)).

### Précautions

- **MISE EN GARDE** : Pour usage sur les animaux seulement.
- Conserver à une température variant entre 2 et 8 °C (35 et 45 °F). Ne pas congeler. Bien mélanger avant l'utilisation. Utiliser le contenu complet après l'ouverture.
- Ne pas vacciner durant la période de 21 jours avant l'abattage.
- Une réaction isolée peut se produire au site d'injection. En cas d'anaphylaxie, utiliser de l'épinéphrine ou l'équivalent. Contient du merthiolate (Thimérosal) comme agent de conservation.
- Ce produit n'a pas été testé sur les femelles gestantes.

### Emballage

Flacons de 50 ou 250 ml.

## Caractéristiques Clés

- **Testé sur les porcs dans des conditions réelles d'élevage.**
- **Système d'adjuvant trivalent StimGard Plus.™**
- **Sécuritaire: des études ont démontré un taux de réaction <0,3 %.**
- **Facile à injecter.**
- **Le processus de purification avancé permet l'injection d'un faible volume afin de minimiser les réactions des tissus au site d'injection.**
- **Aucun mélange signifie moins de manipulation, d'erreurs et de gâchis.**
- **Codes QR (réponse rapide) sur l'étiquette pour les besoins d'inventaire et de suivi.**

### Renseignements de commande

- Numéro du produit:  
25010c-50 (50 mL)  
25010c-250 (250 mL)



# Circo/MycoGard®

Vaccin circovirus porcin de type 2, vecteur baculovirus tué,  
bactérine *Mycoplasma hyopneumoniae*

Porcine Circovirus Vaccine,  
Type 2, Killed Baculovirus Vector,  
Mycoplasma Hyopneumoniae Bacterin

Vaccin contre le circovirus porcin, type  
2, vecteur baculovirus tué, bactérine  
de *Mycoplasma hyopneumoniae*

Circo/MycoGard® | 250 ML  
250 DOSES



This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy piglets, 10 days of age or older against Porcine Circovirus, Type 2, and *Mycoplasma Hyopneumoniae*.

To review efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**ADMINISTRATION AND DOSAGE:**  
Dose: 1.0 ml intramuscularly (I.M.).

**CAUTION:** For animal use only. Do not mix with other products, except as specified on this label. In case of human exposure, contact a physician. Store at 2 to 8°C (35°F to 45°F). Do not freeze. Shake well before use. Use entire contents upon opening. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Transient reaction may occur at the injection site. If anaphylaxis occurs, use epinephrine or equivalent. Contains merthiolate (Thimerosal) as a preservative. This product has not been tested in pregnant animals. Revaccination interval not established.

Open Here / Ouvrir Ici →

Product No./ N° produit:

Serial No./ N° série:

Exp. Date/Date de pér.:

Manufactured by/Fabriqué par :

**Pharmgate Biologics**  
2575 University Avenue  
West, Suite 100,  
St. Paul, MN 55114  
1-800-465-2450  
VLN 329

HINGE

Ce produit a été démontré comme étant efficace pour la vaccination chez les porcelets sains, âgés de 10 jours ou plus contre le circovirus porcin, type 2 et *Mycoplasma hyopneumoniae*. Pour consulter les données sur l'efficacité et l'innocuité, visitez le [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**Administration et dosage :** Dose: 1,0 mL par voie intramusculaire (IM).

**Précaution :** Destiné aux animaux seulement. Ne pas mélanger avec d'autres produits, à moins d'être indiqué sur l'étiquette. En cas d'exposition humaine, consultez un médecin. Conserver entre 2 et 8 °C (35-45 °F). Ne pas congeler. Bien agiter avant l'utilisation. Utiliser tout le contenu de la fiole ouverte. Ne pas vacciner dans les 21 jours précédant l'abattage. Une réaction transitoire peut se manifester au site d'injection. En cas d'anaphylaxie, utiliser de l'épinéphrine ou autre produit équivalent. Contient du merthiolate (Thimérosal) comme agent de conservation. Ce produit n'a pas été testé chez les animaux en gestation. L'intervalle pour les rappels de vaccin n'est pas établi.

## Pharmgate Animal Health swine vaccines/bacterins.

Product	Doses	Pharmgate Product Number
MycoGard® (2 dose)	50	20020c-50
MycoGard® (2 dose)	250	20020c-250
MycoGard-1™ (1 dose)	50	21010c-50
MycoGard-1™ (1 dose)	250	21010c-250
CircoGard® (1 dose)	50	22010c-50
CircoGard® (1 dose)	250	22010c-250
Circo/MycoGard® (1 dose)	50	25010c-50
Circo/MycoGard® (1 dose)	250	25010c-250

